

# 広島市・福山市に 新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場を設置しています

○広島県では、市町と連携して、新型コロナウイルスワクチンの追加（3回目）接種に取り組んでおり、現在、広島市及び福山市に接種会場を設置しています。

○ワクチン接種は重症化予防となり、医療負担の軽減に繋がります。医療のひっ迫による、再度の「まん延防止等重点措置」とならないためにも、積極的なワクチン接種について検討をお願いします。

追加（3回目）接種用接種券付き予診票をお持ちの県内在住の方で、2回目接種の完了から6か月以上経過した18歳以上の方は、当会場で接種可能です。

## 1 会場情報

### (1) 広島会場

場 所	天満屋八丁堀ビル6階 広島県広島市中区胡町5-22
設置期間	令和4年1月28日（金）～4月16日（土）（44日間）

広島会場予約状況

3/10時点

接種日	曜日	接種時間	予約状況
3月18日	金	13:00～20:00	○
3月19日	土	10:30～17:30	○
3月20日	日		○
3月21日	月		○
3月25日	金	13:00～20:00	○
3月26日	土	10:30～17:30	○
3月27日	日		○
3月28日	月	13:00～20:00	○

○は半分以上空きあり、△は半分未満、×は0人

### (2) 福山会場

場 所	広島県立ふくやま産業交流館（ビッグ・ローズ） 広島県福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5
設置期間	令和4年2月4日（金）～4月16日（土）（32日間）

福山会場予約状況

3/10時点

接種日	曜日	接種時間	予約状況
3月18日	金	13:00～20:00	○
3月19日	土	10:00～17:00	○
3月25日	金	13:00～20:00	○
3月26日	土	10:00～17:00	○
3月27日	日		○

○は半分以上空きあり、△は半分未満、×は0人

予約枠に余裕がありますので、ぜひこの機会に追加（3回目）接種を御検討ください！

## 2 予約方法

### 電話・WEB

予約コールセンター電話番号：082-207-0900（受付時間：8時～20時）

予約サイトURL：<https://jump.mrso.jp/hiroshima/>（24時間受付）

二次元コード：



## 3 その他

- (1) 今回の大規模接種会場は、モデルナ社製ワクチンを接種します。
- (2) ファイザー社製ワクチンを1・2回目で接種した方も、追加（3回目）接種でモデルナ社製ワクチンを接種することができます。

### <参考：厚生労働省新型コロナワクチンQ&A>

Q. 追加（3回目）接種には、どのような効果がありますか。

A. 追加接種を行わなかった場合と比較して、デルタ株等に対して、感染予防効果や重症化予防効果等を高める効果があります。

Q. オミクロン株にも追加（3回目）接種の効果はありますか。

A. オミクロン株に対する初回（1回目・2回目）接種による発症予防効果は、デルタ株と比較して低下するものの、追加接種により回復することが示唆されています。入院予防効果も、デルタ株と比較すると一定程度の低下はありますが、発症予防効果と比較すると保たれており、追加接種で回復することが報告されています。

# 追加（3回目）接種に使用するワクチン についてのお知らせ

接種費用  
**無料**  
(全額公費)

武田/モデルナ社のワクチンも  
3回目の接種に使用できるようになりました



◎**接種の対象** 2回目のワクチン接種を終了した18歳以上の方

◎**使用するワクチン**

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は**半量**になります。

◎**3回目の接種の安全性と効果**

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社 (2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社 (2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛 (78.3→83.0%)、疲労 (59.4→63.7%)	疼痛 (88.3→83.8%)、疲労 (65.4→58.7%) 頭痛 (58.8→55.1%)
10 - 50%	頭痛 (54.0→48.4%)、筋肉痛 (39.3→39.1%) 悪寒 (37.8→29.1%)、関節痛 (23.8→25.3%)	筋肉痛 (58.1→49.1%)、関節痛 (42.9→41.3%) 悪寒 (44.3→35.3%)、リンパ節症 (14.2→20.4%)
1 - 10%	38度以上の発熱 (16.4→8.7%) 腫脹 (6.8→8.0%)、発赤 (5.6→5.9%) リンパ節症(*) (0.4→5.2%)	38度以上の発熱 (15.5→6.6%) 腫脹・硬結 (12.3→5.4%) 紅斑・発赤 (8.7→4.8%)

(注) 対象/人数：ファイザー2回目 16～55歳/2,682人、ファイザー3回目 18～55歳/289人、モデルナ2回目 18歳以上/14,881人、モデルナ3回目 18歳以上/167人  
(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合： ■ 5ポイント以上少ないもの、 ■ 5ポイント以上多いもの。  
(注) 武田/モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100µg、3回目は50µg接種している。  
(注) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。  
出典：特許承認に係る報告書より

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

◎**1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果**

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン(\*)を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

(\*) 武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50µg接種することになっているが、本研究では100µg接種した結果が報告されている。

ワクチンの組み合わせ	抗体価
ファイザー → ファイザー → モデルナ	抗体価は 上昇
ファイザー → ファイザー → ファイザー	

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021



## よくあるご質問

### Q.武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A.武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

なお、3回目接種に用いる量は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。

(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。

出典：特別承認に係る報告書より

### Q.ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A.1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果(※)が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防(※)の効果が有意に高かったと報告されています。

(※) 重症化予防には入院予防を含む

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman GA, et al. NEJM. December 1, 2021.

### Q.3回目接種はどのようにしたら受けられますか。

A.お住まいの市町村から3回目用の接種券等が送付されましたら、ワクチンを受けたい医療機関や会場をお探しのうえ、予約をお願いします。



### Q.1回目・2回目の接種をまだ受けていませんが、まだ受けられますか。

A.受けられます。公費で受けられる期間は、現在のところ令和4年9月30日までです。この期間であれば、1・2回目接種も無料ですので、ご希望の方はお早めに受けてください。

#### ◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

#### ◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

感染予防対策  
を継続して  
いただくよう  
お願いします。



密集場所



密接場面



密閉空間

「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避



マスクの着用



石けんによる  
手洗い



手指消毒用アルコール  
による消毒の励行

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚生 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。